

DE TYPHO
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM ... MENSE
MARTII 1847...

Giuseppe omonimi non
identificati Fumagalli (omonimi...



67

DE
TYPHO

Quæstiones Inaugurales

per

ALBERTUM DE JONCKHEERE PHARMACEUTICUM DOCTOR
BONONIENSIS, DE PRÆSENTI FACULTATIS MEDICÆ
SECRETARIUM, ORATIONE HUIUS MODI PRÆSENTANTE
ET IN PRÆSENTATIONE HUIUS FACULTATIS HONORARIÆ
MEMBRUM ET HONORARIÆ MEMBRUM ET FACULTATIS
MEDICÆ BONONIENSIS ET FACULTATIS
MEDICÆ BONONIENSIS ET FACULTATIS
MEDICÆ BONONIENSIS ET FACULTATIS

ADJUDICE

D. DOCTORE THEODORO HELM

*Classicus Medicæ Therapeuticae Specialis Prof. O.
Director Anatomici Theatralis etc. etc.*

CUM ADJUNCTIS THESIS DEPENDENTIS

VENIET MARTII 1843

PRÆLACI DISQUISITIONI OFFERANT

JURACALLI JURACALLI

Ex Typis in Fro. Tsch.



TROISIÈME ÉDITION

ET REPRODUCTION POUR ET MOINS



100

E. EDUARD JOSEPHUS DEBATA

HAARLEM LINDEN

DEBATA AC. DEBATA DEBATA

DEBATA.

DEBATA DEBATA DEBATA.



ROMULA DE HISTORIA

Morbus de quo pertractandus videtur, confusus a veteribus cognitus erat. Ipsi vel a superstitiosis studiis haecumiles pathologicae negligere cuncti, vel quae ipsius momentum ad morborum causam dispartendam parum aut nil aponebant, tantummodo a symptomatibus decursumque morbi seducti fuerunt, ac inde illorum gravitate atque frequentia perspecta, morbi decursum protuberantem, cunctique fieri semper letale reperto, in medium protulerunt febrem malignam nomen, quod citius vel rursus indicaret, tamen periculum atque ulteriorum investigationum necessitatem satis clare patebatur. In posteriores insulti potius auctores, qui in aliquorum morborum decursum phenomenon stupida, atroxia, adnantes cernunt, quae de ipso tamen redderent rationem. Primi, qui glandularum,

mesentericarum tantumque aberratione et symptomata plerumque comitari solentiverunt, fuerunt Stoll, Frost, Bayle, Baglivi, Morgagni et praecipue duo postremi. Sed hi omnes tamen fortuito ferme talia observabant. Racker et Wagner in descriptione febris malarum Gualtero, febris typhoides tanquam morbus sui generis cum propriis symptomatibus eademque lesionibus primis declarabant. Nihilominus haec omnia illis non fuerunt ad hanc febrem illustrandam, atque ab illa morbo rite distinguendam, donec Petit et Serres 1814 observationes studens glandularum Peyer et Bruneri ut tunc evincerent sermone thephi ex illis oriri. Postremis hinc temporibus Rottmann et ali Glendinal veram glandularum Peyer et Bruneri lesionem artem evidenter ostenderunt.

SYNOPSIS.

Febris typhoides variis nominibus designata fuit. Non tamquam febre acuta praeconceptam quam de hujusmodi collectione actum habebat opinionem propriam fecit nomen. Et ita a Racker et Wagner nomen fuit Febris Malarum, Entero-Ma-

enterica a Fink et Potts, Gastro-Enterica a Reynolds, Dithimenteria a Bretonneau, Hec-Ilia a Bally, exanthema intestinale ab Andral, et alia perniciosa nautica a perniciosis entericis. Quale vero est istis nominibus aptum magis ac congruum? Hec in eligendo nomen esse intelligere debui, neque illuc statim valere cum sciam febri typhoides nomen perloque longum videri quippe quod non morbi essentiam, sed tantum symptomata denotat a variis organicis affectionibus saepe indistinctam. Sed alia nomina verum morbi naturam expriment? Igitur, sicuti Chamelli viriis nescio, ita eodem nomine quod ille utitur, et ego utar.

SYMPT.

Si non decurrens febris typhoides observamus attente in ipso phaenomeno quatuordecim ministrationes, quae ut se invicem succedunt; et dum aliqui ex hanc symptomatibus, morbo progrediente, aliant, ut et alia obsempantur, et tunc aliam in scenam redeunt, et causa quidam cum ordine.

Ab hoc autem, ut idem de morbo clarius sit patetis quodam tempore intervalla statuere, in quibus dicit phaenomena con-

8

autem vel eadem frequentius advertitur, et hoc vocantur *Stadia* vel *Perioda*. In universa morbi decursa non cum Chorea quâque advertitur *stadium*, quarum duo prima (*Prodroma* atque *Incubatio*) nulli sunt adstricta temporis spatio; tunc postrema vero in septem circiter preceduntur dies, quae ab quo Chorea *perioda* vocatur.

PRODROMA ATQUE INCUBATIO.

Febria rhegmatodes incursio non semper eadem in modo lacum habet, sed quandoque citius adgredit, quandoque praesent praenomena aliquae, quae prodroma vocantur. Prodroma haec minime sunt peculiaris morbi de quo loquimur, sed illis quaeplurimum ad illi conspiciuntur et praecipue constitutionibus. Quando vero in incursu prodromi, physionomia praesentis alteratur namque immittit hilaritatem et tristitia ac melancholiam. Patientis diu affectu non incumbere et praecipue mentalibus impeditis, citissime delegitur, de viis magis consequitur deliratione, accendit anxia, super ora foetor, postures, aliquoties vomitus, vomitantes, urinae deano foetui coloris, diarrhoea infarctum supervenit, quae post breve

tempus generalem sponte fieri cessat, et rursus post resolutionem adparet.

Incubatio == Incubatio symptomato tam in illis, in quibus postrema adparet, quam in illis in quibus haec delictum mentis cum intensitate occurrunt. Generalis lephalalgia est permalesia ingreditur, quam super mox a lectulo euegit, acutior. Tunc physiologia perturbatur, et non raro in illa aliquid jam superius videtur conspicimus; contractilitas spontanea fit languida, frigoris occupaciones a validioribus febre subsistentis lectulo negram eugant. Disturbata nam et phosphenia incubatio conspicimus suffi, quae in prima vel altera die morbi se potest, subsequant dolores abdominales in intensitate variis ac uide. Tali modo offunditur incubatio symptomato, adhuc et alia in potestatem euegit, sed quia haec in studio morbi jam potestis ac potestis illis ad singula perioda, quae sequuntur, demonstrantur.

Prima periodus == Physiologia alterata, quae jam ab initio adparet, adparet; totius indifferens esse effect, super super apertum super lectulum occupans cubana tunc potestis dei responsum, incubatio nam nervos intellectuales sua facultate.

Ager saepe saepeque insanens dedit aeternam, ut et in aliquo mundi momento credidit subito terrore expungit. Respiratio quae in frontis generationis aeterni characteris et intensitate variat, modo pressiva modo pulsiva, modo gravis modo levis, hoc semper continens per unum primum periodum decessum, scilicet tunc spe aliqum modum amovetur. Super alia tunc dicitur tunc tunc, super alia, vel a tunc viciis obliquo vel ferebatur obliquo, ad aliam rubrum et ad marginem; alia intensum magna cum expectantia potestatem religionem videretur. Adipiscitur vel nullas, vel depravatas, vel obliquo ita et obliquo sic dicta fuisse comit. — Respiratio modifera; ager depressus, et musculis hoc et illis tunc obliquo extendit. Tunc alia vel variis in intensitate ac frequentia; sub expectantia quae in alia-hoc tunc viciis, quae tunc obliquo, replentur. Hoc tunc obliquo quod depressus non semper a tunc pathologica pulmonum pondere, sed quodque mechanice modo productur ex tunc per a meteorismo, qui diaphragmam comprimit, ex altera a tunc et sanguine coagulato, quod tunc obliquo.

Abdomine tunc, volumine tunc, tunc

aductum extendit, et si digitum tota quadam aspera cum protuberantia eorum duram tympanicam tollit, et phosphenon hoc, quod manifestum nascipitur, fore manifestum deficit. Si ventrem medicositer tractemus hoc et illic asper durescit potius; praeterea ad regionem ilio-caecalem sub manu premente pervenit utroque percutitur percutitur ad latus cecum, qui probabiter a collectione materiei terribilissimae, non cum manifestis in hac collectae regionis; aliam hoc, teste Chamisso, in alio marte percutitur, perfringitur contra in fibre-theophodis. Phosphores non eadem semper characteris, neque quod materiam excretionem, neque quod qualitates materiem ipsam, offert. Quod numerum inter syphaceras ab una usque ad quatuordecim aut viginti praesentibus perferi possunt. Quod qualitates cum plene liquidas, nunc ferissimas, aliquid, menses, lactentissimas semper evadant. Urinae parva in quantitate coloris lateris, levis odoris = Circulationis phosphenon = Primit in debili morbi in systemate circulatorio videtur. Et rursus cum vero phlogos symptomatibus excitata, potius perfringitur, duri et asperi; cum rubra utroque. Phosphenon aliud quod mi-

II

retiliter, ut dicitur, ad diagonalem occupantem inservit, cum in spatium, quae generata linea et gestata a nervis fuit; invenitur tamen apud naturam convallium cum epistemonia mortem agrestem ministrante.

Secunda Periodus — Ad hanc partem vel generatam inservit secunda periodo nonnullorum, periodo huc et illuc super oblongum atque prout apertum oritur convallium cum nino fuit thyphoides periodus, (eruptio thyphoides occupata) quae causare videtur et morbo cum coloris a linea demissa parte ad dera latus, super eadem partem vel nullam extollens, sub praesentia convallium quae a dextra, tribus usque ad dexteram perdurant dies — Progre- diens morbo, observatur et alia eruptio, quae consistit ex parvis vesiculis emulsi- vae, transparentibus, magnitudinis qua- drante lineae, quae oblique insuper lo- centur se praebent, ad perpendicularium dispo- nunt, et raderem occupantur. Haec in collo, axillis, inguine plerumque locum lo- cum, et flevit solo locum deliquant. — Haec in periodo praesentia eorum grati- ad dextram locum, et alia vesiculae hy- draeque adnota fere, non constando est.

13

Eudemulorum quoque lingua, palati, labiorum, gingivarum, cataplectenter; dentibus a teretibus nigrescente fuliginosa abstergi, quod si auferatur statim reproducentur. Contraxerunt manducula suboculis facta, eademque irreverentia circumstantibus depositis occidunt; quod sunt phenomenon maxime in gradu animorum. Modificationes in fasciis oculis cerebralis quoque contingunt. Cephaligia adest, sed anger immobilis vomitulentus descendit, apertis oculis et interrogantur indistincta proferri verba. Aliquoties condito habemus oppositi, et tunc in delirio non placide non furioso anger versatur. Prae aliis omnibus auctoribus in lingua morbi historia de phosphenis alio mentem fecerunt, alii de Cephalia, quae facilius cum stupore statim confunditur et accutis ab ipso distinguenda — Pulsum parvum, debile, tremulum, per frequentes, non negligit neque ad centum et quadraginta ictus in una hora momento, inguntur. Cutis est alba et calida uti moribundis, qui mollement affert manus exploranti. Diarrhoea vel est suppurata vel calida moderata, melaecolica et non est adhaerens, neque tendens, et sic de aliis dicitur dispositis.

Tertius periodus — Proxi morbus in hoc

cum vel minus flexis flexum ita phœnomena que in ipso observantur, dissepant. Quando ad convalescentiam vergit (id quod non scilicet a symptomate graviore fitur, non sub flexu secundæ vel ab initio tertie periodæ) signum boni omnia dant in mutata physiœnomie conditione; in ipso quidquam jam tolerantia reddit; ager regere capitis respondit, et de valitudine sua exemplarius nudit. Si autem in statu fuit cœcitate de hoc in tranquillo sono transit, a quo cœcitas ad vitam ut novam revocatur. Contractilias muscularis vacillat, et ager exemplarius perficit motus omnes potius obrogatos. Eodem tempore lingua et ea movetur, emperguntur, atque respiratio facilis perficitur; mentis omnia vacillant; facies minus lœvis; urinae impetu incipit et clarescit fluxus. Colla molida et suberitibus beneficiis. Crassas excrementa mollium sub adipea voce offerunt, unum, uno verbo, convalescentiam nuntiunt. — Sed si morbus ad ultimum per exitum et omnia ingravescent symptomata physiœnomie contraria, mandibula, hipostasie, et letali in cura a vita recedit. Aliquoties ager in articulo mortis decurrit dum vires periculum longe adhuc videtur et impervius a dolori-

has diarrhoeas ac vomita corruptas cibi, tum de periculis exitu ab intestinali purificatione tutius possunt proferre iudicia; nec si auctoribus fidem habenda est, exor qui jam convalescent tutus ab hoc exitu eruat.

LIPSCOM HISTORICUS.

Quoties Individuum per febrem typhoidem transiit, atropia periculis, involutione semper febrem gastro-entericam pathologica in statu? Andral, Berville, Loeu et alii historias Individuorum ex affectione typhoidea interruptorum in medicina proferunt, quibus in tubo gastro-enterico aliquid morbum invadent. Chomel e contra, eadem remissionem diutius statuta in constantem vel fere constantem, et in non constantem ad priusam referet. Illas priusam viam. Quotiesque modo tanta res se habet, id certum, quod histores notantur, et postquam Anatomiae Pathologicae studium prestante cepti omnes auctores de ipso percontantur. Ipse in glandula Peyer et Brunneri et Meckelii sedem potenter. Calverleyus diarrhoea septima die (etiam antea hac tempore nomini foras accessio fuit diarrhoea) glandula Peyer et Brunneri

tandem, et menenteriales pariter omnes, v. l. hinc inde superfluitate coloris rubei praese-
bentes. Decima prima vel decima secun-
da die valvulae glandularum crassae, et illae
Feyeri et Brunnieri rugosae fiunt, et adpe-
rent in posterum colore sanguinolento cum
apice emulso. Decima quarta vel decima
quinta die crassa affluunt, quae decedit
in subsequens die, adparitque membranae
mucosae, quae interdum una cum perito-
neali est destructa, unde intestinorum per-
forationes contingunt. Tandem glandulae
Feyeri et Brunnieri ad pituitam redeunt
statum electricum efformando, quam in po-
sterum crassam. Sed non omnes folliculi
quae Feyeri et Brunnieri glandulas constituent
eodem sunt tempore affectae; pituitas glan-
dulae quae valvulae duo-oculi propinquiores
sunt affluunt, in posterum productae sunt
progressivo modo illae quae ipsae longinquae
conspiciuntur ita ut dum aliquae ad electrici-
tatem vergunt aliae adhuc in studio im-
perfecto, immutantur; et de de glandula
Menstruaria dicatur.

APPENDIX.

Existunt ne causas ex quibus tantæ ratione febris typhoidæ potestas repetere? Si hujusmodi morbi historiam exemplariter, ut illas ab Andrel, Cheneil, Louis, Rostan et ab aliis in locum editis, perlegimus, cuique tantum in sumere circumstantias aliquas reperimus morbi evolutioni propicias, quæ invasionem præconstruunt; et quæ vero constantes, illas cujus actio immediata morbum propiciat, alias destruit. Hæc porro quæ simpliciter ferre videntur actus a decem, et octo ad triginta annis ætatis, ætatis, laboris per diu protractus, abstinencia lascivias, hæmorrhagias, et nimiam humorum nobilium puritatem, cuius præsertim doctores modo dicti et alii quædam plerumque inter causas considerantes, de infecto in magna urbe habitatione, mentionem faciunt. — Nunc noscum ne credemus neglexisse morbum, nisi aliquis addiderit de contagione febris typhoidæ. Aliqui inter quos Rostan, Le-Flèche, Gendron contagionem acriter defendunt, et tunc cum infans causa immediata ipsa pro causâ huiusmodi abesse existit. Sed a plu-

nis hinc inficitur argumentis: paucitas, periculositas, unci apud febres thyphoides agrestantes species continue variatae in co-
 enationibus proximae contagionis utraque, et
 tamen manus evadere. In Nosocomiis alii
 regni hospitalis patientes diutius obsequuntur
 stragulae, qui lectus, qui stragulae prius
 laborantibus febri thyphoideae inserviebant,
 quin in ipsis morbus manifestatur. — Ob-
 servatur rursus aliqui in Nosocomiis a febri
 thyphoideae correpti, sed hoc ad aliud expro-
 mit, quod etiam et istos in Nosocomio non
 humani evadere ab illa causa quae illi,
 qui extra variatur. Quasi utriusque partis
 argumentis cardinalis dum opinioem illor-
 um qui secundum hanc sententiam ducunt,
 affirmat contra quod in contagione
 in hoc morbo adeo hoc levissimum in gradu
 existere.

DE NATURA MORBI.

Circa huiusmodi morbi naturam varias et
 posse infinitas prolatas fuerunt opiniones.
 Sed nihil verius et formae impraeiudicatum
 adhuc impossibile totum de eo reddere ri-
 gorem.

Ergo et illas omnes nota Brevisse pro-

tensionem eploica, qui in gastro-enteritis locubet anacitica; et illos affores, qui ab initio in gastro-enteritis ac postea sanguinis rami vitia omnia explicitenter symptomata; et illos a Bretonneau, Louis, Chomel aliisque profusus qui in disrupta sanguinis qualitate, peculiaris constata intestinatorum cruentata, consistunt; de ratione potius intestinalium lesionum aliquid tentum dicam. Et in prima, hinc spectata dant nobis aliteriter questionem: Si hinc characterem phlogosum vel non relictum, et si hinc phlogosum primarium vel secundarium evadat. — Si nobis, opportunitate concessa, plures vicibus totum alimentorum indidendum in prima vel altera vel tertio in periodo febris dyphoides interruptum cunctare, ac rubore et tumore in prima periodo, ab acutibus resolutis, emolumentis suppurationis et necrosis in secundo et tertio quae certe interveniunt, hinc in dubio phlogosum vestigia aperte fieri debemus. Et prima questio videtur soluta. — Si per superfluitatem alimentorum in observationes nostras conspicimus, quod circa ventus, qui hinc ubi ventus, ubi rubor, tumor etc. et alios insiduosos qui normali sunt in statu, et phlogosum vel ejus vitia videtur comparere

20

non continens modo aliquam intestini partem, sed huc et illic sparsim se se effertur considerandum ad hanc et veritatem alteramque exanthematum. Nam exanthemata quæ sparsim super totum aliquem se se possunt, nunquam primarii, sed secundarii tantum sunt existimanda. Et hoc sub respectu quatuor varietatis in exanthemate Intestinali Audet, quod ita febrem typhoidem nuncupare!

DE THERAPIA.

Diversi in numero et huc hinc se dissepantes curandi modus oblati sunt. Non omnes, nisi vilius, eodem sub aspectu febrem Typhoidem consideraverunt, proindeque ab hac opinionum varietate varietate Therapies species orti novae sunt. Tamen, qui attentis phænomenis ac constitutis morborum curas observabant quæ in domos morborum confingebant, febrem prius confusorum mutationem eventuosioribus ab ipsa critica occupatis, observabant, quæ mutare, ubi morbus regulariter incidebat, etiam atque etiam creabant, sed se aliquid subiecerat quod mutatum criticis morum periret, hoc ante pigeant. Auctores, qui in

febris typhoides humores et principes sanguinis putrescenti exponant ad substantias sic dictas ante putidas, uti camphora, muscus, china etc. confugere. Et tandem quomodo usque diversis adhibere substantias qui (Brema et molissimum vel) morbus adhibere, aetheria impetant. — Rursus in curacione febri patientium Jona methodi Bremae inusitata ac aliam ducere perspicua, aliam methodi medica in modum attali, qui componitur et aliam sanguinis depletionem generalem ab illis parata non cum in postremum valde adhibere praeparationem de alia, et contraindicantem ipse videri. Bremae methodus pathologica alia, stimulantibus et tonica prescriptis methodum stricta adhibere videntur. Fecit et illi, qui credentes in febre typhoides sanguis aliam carbonem quippe cum in circulo sanguifero inducere omnes vias periclitari vult. Hamilton et medici Angli ad aliam adhibere praeparationem.

Sed inter methodos omnes illi qui sanguis alii videntur a Champele fuit proposita. Illi habito respectu febri typhoides diversa, diversa methodi medica videntur et methodos rationales ab ipse accipiat. Si symptoma praesentia pilosorum

tunc cura anaphlogistica, vel non tam valida pro facilitate, quæ adynamia in secum venit. Quando forma secundum bilicos tunc methodo hactenus credit, et potius reliquientes subvertit, aliqui tales modis sunt edificandi; et quæ ab istis videntur statim edicenda, metice jurent. Substantie hactenus anaromatizantes, si forma est nervosa follicular subsequente. Quando porro symptomata stantida adparent tunc cura, utpote hanc a statu phlogistico vel adynamico originem ducant, variata solet, et anaphlogistica in prima et tonica in secunda videtur esse. Si forma adynamica insit tunc ut videtur tonica et cibiva, nervosa, camporea, vicum etc. reliquenda erant. Alias quæpiamque opidicas, etiamque methodi curandis quæpiamque, et omnia plus minusve miracula factant. Sed morbi decursum irregularia, modificationes quæ complures observantur, quia de his methodi totum profere possint rationem, ambiguitas nimis in quam hic occurrunt quod morbi terminationes, et causas constituent per quas hactenus hypochondriac therapia semper una et Medicinæ practicæ incipit erit.

FINIS

THESES DEFENDENDÆ.

1. Aeris inoculatio in asplenicis periculosa.
2. In hæmorrhoidum remedia stimulantia non
semper utilisanda.
3. Perperam medici a collibus uribiles utro-
que medicamentis absterrent, quousque in
pluribus casibus effluclacitiam pharma-
cum habetant.
4. Epistaxis in typha vena et symptoma-
tibus pathognomonice sistere.
5. Coleraa sanguine certum suppositum phlo-
gonum indicium.
6. Phosphor calidus in Rachitide valde in-
dicanus.
7. Ad convulsiones propinquas infantes in-
judam centri nervosi semper necessarii.
8. Iperemie cadaverice non a sola lege
gravitatis pendere.